

NAVODILO ZA ODVZEM BLATA ZA PREGLED NA PRISOTNOST SKRITE KRVI

Za pregled blata na prisotnost skrite krvi odda preiskovanec **3 vzorce blata** treh spontanih iztrebljanj. Zdravnik se lahko odloči tudi za preiskavo samo enega vzorca blata. Najprimernejše je iztrebljanje v tanko plastično vrečko, ki jo ohlapno namestimo v straniščno odprtino in fiksiramo s straniščno desko.

Nekaj dni pred odvzemom vzorca blata preiskovanec ne sme uživati odvajal ali sredstev proti driski. Sedem dni pred odvzemom vzorca blata ne sme jemati aspirina in drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil ter kortikosteroidov, razen če ni nujno potrebno.

Vzorci blata analiziramo s kvalitativnim specifičnim imunološkim testom za človeški hemoglobin, zato predhodna dieta ni potrebna. Test zazna samo krvavitve iz debelega črevesa, ne pa tudi iz zgornjih prebavil, ker se hemoglobin v prebavilih razgradi.

VZORČENJE



V laboratoriju ali ambulanti dobite ob registraciji standardne posodice za blato z žličko, ki so označene z laboratorijsko evidenčno nalepko s podatki o pacientu.

Vzorci odzvamemo z žličko, nameščeno na pokrov zbiralne posodice tako, da zajamemo vzorec na treh različnih koncih blata – največ za žličko blata in vzorec zapremo v posodico ali 1-2 ml tekočega iztrebka.

HRANJENJE VZORCEV IN DOSTAVA V LABORATORIJ:

- vzorce hranimo v hladilniku za čas zbiranja
- vzorci so stabilni v hladilniku do 3 dni
- po 3. vzorčenju (3.dan) dostavimo vzorce v laboratorij

Rezultati se izdajo naročniku (zdravnik ali samoplačnik) v istem dnevu, kot so bili oddani vzorci blata.