


## NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA NA PRISOTNOST JAJČEC PODANČIC

**Podančica** (*Enterobius vermicularis*) je majhna, približno centimeter velika glista, belkaste barve. Uvrščamo jo med notranje zajedalce človeka. Samica vali jajčeca, ki so ovalne oblike, v njih se nahaja ličinka. Jajčeca odlaga v okolico zadnjika, kar povzroča značilno srbenje. Jajčeca podančic redko najdemo pri preiskavi vzorca blata na parazite, ker se jajčeca ne izločajo z blatom. Samica parazita leže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub in to običajno ponoči. Jajčeca se prilepijo na kožo okoli zadnjika. Dokažemo jih s pomočjo odtisa z lepilnim trakom perianalnega področja.

### NAVODILO ZA ODVZEM ODTISA

Zvečer ritko umijemo in NE namažemo s kremo. Odtise napravimo zjutraj, pred uriniranjem brez predhodnega umivanja. Vzamemo približno 5 cm dolg in 2 cm širok PROZOREN LEPILNI TRAK (selotejp) in ga prilepimo otroku na ritko – na analno odprtino tako, da malo razpremo ritnici. S prstom podrgnemo lepilni trak, da se prilepi in ga takoj odlepimo, nato ga previdno prilepimo na stekelce, ki ga dobite v laboratoriju - pazimo da ni mehurčkov. Vzorec čim prej dostavimo v laboratorij. Če imate več vzorcev jih pospravite vsakega v svojo kuverto, na katero napišete ime in priimek preiskovanca.



Slika: Brezbarvni lepilni trak se pritrdi na stekelce po odvzemu odtisa. Pozor: brez mehurčkov!



Podančica (*Enterobius vermicularis*) meri cca 1cm. Mikroskopska slika podančice in jajčec.

